

	Pre Operatorio						Mod. 0055	Pag. 1 di 2
	TABELLE RIASSUNTIVE SOSPENSIONE NAO, TAO, ANTIAGGREGANTI ED ALTRI FARMACI ISTRUZIONI PER IL PAZIENTE						Parola chiave:	NAO - TAO - Antiaggr
							Rev. 00	del 24/10/2024

ETICHETTA PAZIENTE

Tempo di sospensione NAO ALTO/MODERATO rischio di sanguinamento									
FARMACO	-5	-4	-3	-2	-1	Intervento	+1	+2	+3
XARELTO (Rivaroxaban)	SI	SI	Ultima dose h 8.00	NO	NO	NO	NO	NO	SI
ELIQUIS (Apixaban)	SI	SI	Ultima dose h 8.00	NO	NO	NO	NO	NO	SI
LIXIANA (Edoxaban)	SI	SI	Ultima dose h 8.00	NO	NO	NO	NO	NO	SI
PRADAXA (Dabigatan)	In base alla cl. della creatinina. Formula calcolo cl. creatinina: $\frac{140 - età}{72 \times scr} \times peso$								
Cl Crea ≥ 80	SI	SI	Ultima dose h 8.00	NO	NO	NO	NO	NO	SI
Cl Crea 50/79	SI	Ultima dose h 8.00	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI
Cl Crea < 50	Ultima dose h 8.00	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI

Tempo di sospensione NAO BASSO rischio di sanguinamento									
FARMACO	-5	-4	-3	-2	-1	Intervento	+1	+2	+3
XARELTO (Rivaroxaban)	SI	SI	SI	SI	Ultima dose h 8.00	NO	NO	NO	SI
ELIQUIS (Apixaban)	SI	SI	SI	SI	Ultima dose h 8.00	NO	NO	NO	SI
LIXIANA (Edoxaban)	SI	SI	SI	SI	Ultima dose h 8.00	NO	NO	NO	SI
PRADAXA (Dabigatan)	In base alla cl. della creatinina. Formula calcolo cl. creatinina: $\frac{140 - età}{72 \times scr} \times peso$								
Cl Crea ≥ 80	SI	SI	SI	SI	Ultima dose h 8.00	NO	NO	NO	SI
Cl Crea 50/79	SI	SI	SI	Ultima dose h 8.00	NO	NO	NO	NO	SI
Cl Crea < 50	SI	SI	Ultima dose h 8.00	NO	NO	NO	NO	NO	SI

La sospensione dei NAO non prevede terapia ponte con EBPM.

	TABELLE RIASSUNTIVE SOSPENSIONE NAO, TAO, ANTIAGGREGANTI ED ALTRI FARMACI ISTRUZIONI PER IL PAZIENTE	Mod. 0055	Pag. 2 di 2
		Parola chiave: NAO - TAO - Antiaggr	
		Rev. 00	del 24/10/2024

Tempo di sospensione TAO								
FARMACO	-5	-4	-3	-2	-1	INTERVENTO	+1	+2
COUMADIN	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI
EBPM	NO	NO	SI	SI	Ultima dose h 8.00	SI	SI	NO
SINTROM	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI
EBPM	NO	SI	SI	SI	Ultima dose h 8.00	SI	SI	NO

Sostituisce con:

☐ Clexane 4000 UI/die
 ☐ Clexane _____UI_____
 ☐ _____

Tempo di sospensione ANTIAGGREGANTI												
FARMACO	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	INTERVENTO	+1
CARDIOASPIRINA (Prevenzione primaria)	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI
CARDIOASPIRINA (Prevenzione secondaria)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI
ASCRIPTIN 300 mg	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI
TIKLID (Ticlopidina)	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI
EFIENT (Prasugrel)	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI
PLAVIX (Clopidogrel)	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI
BRILIQUE (Ticagrerol)	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI

La sospensione degli ANTIAGGREGANTI non prevede in genere terapia ponte con EBPM.

ALTRI FARMACI

_____ sospende _____ gg prima dell'intervento.

 _____ sospende _____ gg prima dell'intervento.

 _____ sospende _____ gg prima dell'intervento.

Data _____

Firma Anestesista _____