

	Direzione Sanitaria PRECAUZIONI PER LE MALATTIE TRASMESSE PER CONTATTO DIRETTO O INDIRETTO	Mod. 0163	Pag. 1 di 1
		Parola chiave:	<i>trasmisss contatto</i>
		Rev. 00	del 15/10/2024

In aggiunta alle precauzioni standard, impiegare le precauzioni per la trasmissione attraverso contatto per pazienti riconosciuti o sospetti di essere infettati da microrganismi epidemiologicamente importanti che possono essere trasmessi per contatto diretto con il paziente o contatto indiretto con materiali utilizzati nell'assistenza del paziente.

Esempi di infezione:

Infezioni dell'apparato gastro-enterico, respiratorio, della cute o delle ferite o colonizzazioni da batteri multiresistenti;

infezioni da clostridium difficile;

infezioni da Escherichia Coli enteroemorragico ;

infezioni da Shigella, Epatite A, Rotavirus;

virus respiratorio sinciziale, virus parainfluenzale, infezioni enterovirali in bambini o adolescenti;

infezioni cutanee da Herpes Simplex, impetigine, pediculosi, scabbia, foruncolosi stafilococcica in bambini ed adolescenti, Zoster in immunodepressi o disseminato;

congiuntivite virale o emorragica;

infezioni virali emorragiche (Ebola, Lassa, Marburg)

1. Porre il paziente in camera singola;
2. Tenere la porta della camera chiusa e il paziente all'interno della camera;
3. Indossare i guanti (sono sufficienti guanti puliti non sterili) quando si entra nella camera dell'ammalato isolato;
4. Durante l'assistenza al paziente, cambiare i guanti dopo ogni contatto con materiale infetto che possa contenere alta carica microbica (materiale fecale e drenaggi da ferite);
5. Cambiare i guanti prima di procedere ad altre mansioni;
6. Rimuovere i guanti prima di lasciare la stanza del paziente e lavare le mani immediatamente; assicurarsi che le stesse non tocchino oggetti o superfici ambientali potenzialmente contaminate al fine di evitare il trasporto di microrganismi su altri pazienti o nell'ambiente;
7. indossare un camice pulito aggiuntivo se si è a rischio di contatto sostanziale con il paziente e toglierlo prima di lasciare la camera assicurandosi che il vestiario non tocchi superfici ambientali potenzialmente contaminate al fine di evitare trasporto di microrganismi su altri pazienti;
8. Limitare lo spostamento ed il trasporto del paziente dalla camera solo a motivi essenziali.
9. Se il paziente è trasportato fuori stanza, assicurarsi che siano applicate precauzioni per minimizzare il rischio di trasmissione di microrganismi verso altri pazienti e la contaminazione di superfici ed attrezzature;
10. Utilizzare per ogni paziente materiali monouso o personali per evitare la condivisione con altri individui. Se non è evitabile l'uso di materiale in comune occorre pulirlo, disinfettarlo e se possibile sterilizzarlo adeguatamente prima che venga utilizzato per altri pazienti.