



Istruzione operativa

**REPARTO OPERATORIO
ORL - Sanguinamento Naso**

Codice

I so 32/P so 01

Rif. Procedura P so 01
Sez. 7.5 MQ



Pag. 1 di 3

Rev. 00

del 18/10/2024

SOMMARIO

1. Scopo
2. Destinatari
3. Modalità operative
4. Valutazione e controllo

Redazione Firma  data 18/10/24	Verifica Firma  data 21/10/24	Approvazione Firma  data 23/10/24
---	--	--

ATTENZIONE: la mancanza delle firme indica che questo documento è una stampa della versione aggiornata disponibile in rete ed utilizzabile per sola lettura.

**1. SCOPO**

Lo scopo della seguente istruzione è quello di fornire le informazioni necessarie in caso di sanguinamento del naso causato da intervento chirurgico ORL di Settoplastica e/o Rinosettoplastica.

2. DESTINATARI

Infermieri e strumentisti.

3. MODALITA' OPERATIVEFERRI:

Prendere il set Settoplastica

Cesta per emergenza (uguale a quella delle Tonsille)

MONOUSO:

N° 1 pacco ORL

→ punta elettrobisturi lunga, caschetto monoluce + centralina

N° 1 paio di guanti anallergici

Può succedere che i medici vogliano vedere con l'ottica, per cui

- Colonna REC ORL
- Ottica 0° + 45° + cavo
- Asciughini nasali
- Farvicet
- Endobach
- Una prolunga per il deflussore con una siringa da 20 ml da raccordare all'ottica per il lavaggio della stessa
- Prendere la pinza bipolare per intervento in endoscopia (container "bipolare")
- Pinza aspirazione/coagulazione (in doppia carta scadenza mensile) + cavo bipolare

MODALITA' TECNICHE:

- a) Preparare il campo sterile
- b) Si procede ad aspirare e a coagulare per controllare un eventuale sanguinamento

4. VALUTAZIONE E CONTROLLO

La valutazione del rispetto della seguente istruzione è competenza del coordinatore o in sua assenza dell'Infermiere delegato, tramite ispezione e verifica casuale del corretto svolgimento delle modalità operative (vedere Modulo 0288).